

胰島素用藥指導衛教單

編號：C 201

一、您目前所服用之藥品：

學名	商品名	中文名	含量
Insulin aspart 速效型胰島素	NovoRAPID FLEXPEN	諾和瑞諾易(橙 色)	預填式注射 300IU/3 毫升/筆
Insulin aspart + Insulin aspart Protamine 混合速效胰島素	NovoMIX 30 FLEXPEN	諾和密斯 30 諾 易筆(藍色)	預填式注射 300IU/3 毫升/筆
InsulinLispro +nsulin Lispro Protamine	Humalog MIX 25/75	優泌樂筆-混合 型	預填式注射 300IU/3 毫升/筆
InsulinLispro +nsulin Lispro Protamine	Humalog MIX 50/50	優泌樂筆-混合 型	預填式注射 300IU/3 毫升/筆
InsulinDetemir 長效胰島素	Levemir FLEXPEN	瑞和密爾諾易筆 (綠色)	預填式注射 300IU/3 毫升/筆
Insulin glargine 長效胰島素	Lantus SOLOSTAR	蘭德仕注射劑	預填式注射 300IU/3 毫升/筆
Insulin Human	RI Actrapid HM	愛速基因人體胰 島素(橙色)	100IU/10ML/小瓶
Insulin Monocomponen	NPH	因速來達胰島素 注射液	100IU/10ML/小瓶
Insulin human	Mixtard	優泌林-混合型 70/30	100IU/10ML/小瓶

二、作用：

(1)用來治療第一、二型糖尿病病人，增加體內胰島素，來降低血糖

三、如何服用本藥品：

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。

一般來說這個藥品的使用方式如下：

(1) 劑量是按照個別情況與患者的需要而決定。建議進行血糖監控及調整胰島素劑量來達到理想的血糖控制。

(2) 以皮下注射方式注射在大腿或腹部，如果方便，也可注射在臀部和三角肌。相同部位的注射點必須輪替，以降低發生脂肪病變的風險。

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail : ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)

四、使用時我該注意的特別事項？

如同一般的胰島素治療，注射部位不良反應可能會發生，包括疼痛、變紅、瘀傷、腫脹及搔癢。同一部位的注射點不停地輪替可以減少或是預防這些不良反應。不良反應通常在數天到數星期內就會恢復。

五、此藥會造成什麼副作用？

最常發生的不良反應為**低血糖**。

六、此藥儲存時的條件為何？

未使用狀態下的儲存：儲存於冰箱中(2°C至8°C)。不要太靠近冷凍庫。不可冷凍。

使用中或隨身攜帶備用時的儲存：使用中或隨身攜帶備用時的本藥品不用存放於冰箱。在室溫下(低於30°C)儲存可達4星期。使用完畢請將本注射劑的筆蓋蓋上。

本藥品應避免過熱及避光。

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail: ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)