

# 上海旺园家禽养殖专业合作社 以人为本，以德为先 创建国内一流的家禽科技企业

地址：奉贤区泰城镇卫季村 1154 号  
联系电话：021-57175121  
手机：13901659483

三农实用周刊  
面向郊区 / 服务农业 / 做农民的朋友

## 【教你一招】

### 羊在冬季的饲喂要点

#### 冬季羊常用多汁饲料有哪些？

羊常用的多汁饲料有胡萝卜、甘薯、马铃薯、甜菜、甘蓝、萝卜、西葫芦、南瓜及青贮饲料等。这类饲料松脆多汁，含有丰富的维生素和糖类，粗纤维少，适口性好，容易消化，能促进泌乳，增进健康，是羊越冬期间不可缺少的饲料。

#### 怎样利用糟渣喂羊？

制糖业的副产品糖渣和甜菜渣，酿酒业的副产品酒糟、啤糟，以及豆腐渣、酱渣、粉渣，羊都能利用。糖渣中的干物质含量在 22%—28% 之间，饲喂时应逐渐增加，让羊适应。也可以在糖渣中添加尿素和矿物质、微量元素混合饲喂。甜菜渣中含有游离有机酸，易引起羊下泻，应控制饲喂量。酒糟含水量较高，约 64%—76%，为了保存，应晒干或青贮。酒糟的营养价值变化很大，适口性差，羊的采食量不高。

#### 怎样满足山羊对盐的需求？

1. 将盐拌入精料中，每日定量饲喂。这种方法常用于种羊或经济价值较高的羊。种公羊每只每天喂 8—10 克，成年母羊每天喂 3—5 克。2. 自由舔食。将盐化水放入槽内，让羊饮用；或将盐放入竹筒内，加少量水，使盐水渗透在竹筒外结成盐霜，让羊自由舔食；也可将盐块放在槽内，让羊自由舔食。3. 将尿素、青干草粉、盐、矿物质、微量元素压成舔食砖给羊舔食，起到多种营养补充作用。

#### 哪些落叶可以喂羊？

羊喜采食树叶，如槐树叶、榆树叶、紫穗槐、白杨叶、构树叶、合欢叶、桑树叶、柞树叶等。这些树叶中粗蛋白质含量按干物质计算都在 20% 左右，营养丰富，是羊抓膘和冬季保膘的物质来源。当寒冬羊群不能远牧时可把羊赶到树林、河滩、道路旁，采食这些树叶。  
中养

## 【生猪行情】

### 肉猪价格(元/公斤)

闵行区: 18.2  
嘉定区: 18.2  
浦东新区: 18.0—18.2  
奉贤区: 17.4—18.0  
金山区: 17.6  
崇明县: 18.4  
长宁区: 18.0  
(本期是 2013 年 1 月 18 日所采的价格。)

### 沪郊毗邻地区苗猪交易价(元/公斤)

嘉定区: 32.0  
浦东新区: 25.0—28.0  
奉贤区: 24.0  
(本栏目信息由上海市生猪行业协会提供)

本版由上海市生猪行业协会协办

#### 遗失声明

上海漪秀时装有限公司遗失外汇登记卡 (NO.0039-6603, 组织机构代码 5964-7472-4), 声明作废。

# 农业部八项措施强化兽药残留监控工作

为进一步加大兽药残留监控工作力度,保障畜禽产品质量安全,近日农业部再次作出部署,要求各级畜牧兽医主管部门充分认识做好当前兽药残留监管工作的重要性和紧迫性,认真谋划、周密部署、标本兼治、细化工作措施,全力抓好畜禽产品兽药残留监控工作,确保节日期间畜禽产品质量安全和有效供应。

**一是认真做好兽药残留检测工作。**切实做好兽药残留抽检计划实施工作,加大抽检覆盖面、增加抽检数量和频率,确保抽检样品的代表性,确保检测数据真实、可靠、准确。要及时查处残留超标产品,对违法行为依法予以严肃处理。

**二是加强和完善监管工作体系。**积极整合执法资源,健全基层动物防疫体系和农产品质量安全监管体系,推进畜牧兽医综合执法,提升基层监管执法能力和水平。进一步完善法规标准体系,为兽药监管工作提供法制保障。

**三是建立健全责任制。**切实把养殖生产者作为畜禽产品质量安全第一责任人的规定落到实处。按照属地管理的原则,建立健全兽药残留监控工作责任制和责任追究制。

**四是深入开展专项整治。**2013 年继续开展抗菌药专项整治工作,各地要在过去专项整治的基础上,加大工作力度,集中力量,抓好落实,抓出成效。

**五是加强行业自律。**要发挥行业协会作用,研究建立兽药监管诚信体系,建立违法企业、违法者“黑名单”制度,进一步落实兽药生产、经营和使用单位质量安全主体责任。

任。

**六是做好教育引导工作。**采取多种形式,加大安全用药规定的宣传力度,努力将安全用药知识宣传到村、普及到户,有效提升养殖业科学合理用药水平。要做好科普宣传,及时解答社会关注的热点、难点问题。

**七是强化应急管理。**提高预警防范能力,完善兽药残留质量安全事故处置机制,明确职责,落实责任,做到第一时间发现、第一时间处置、第一时间发布权威声音。

**八是转变养殖业发展方式。**加大畜禽标准化规模养殖的推进力度,按照产业化经营理念,大力培育高水平养殖龙头企业,强化龙头企业在带动农户开展绿色健康养殖方面的积极作用。发展生产型、服务型、营销型和综合型专业合作组织,提升养殖业组织化水平。  
龙新

## 冬季猪舍保温设备的选择与使用

肉猪各阶段适宜环境温度:小猪(30-60斤)23℃左右,中猪(60-120斤)20℃左右,大猪(120斤以上)18℃左右。小猪对于温度需求较高,一般大猪室温在 15℃或以上即可。

### ●保温设备的选择

现在,猪场的保温设备主要有手摇帐幕、“屋中屋”、保温箱、保温灯、热风炉或火炉几种。

**手摇帐幕:**帐幕必须固定下端,由下往上拉,帐幕高度应根据天气情况、室内温度、空气质量等来决定高低,最高处留有 10-20cm 的空隙通风,上升或下放帐幕时采用逐级放低的方式进行,先放背风面,然后放受风面。

**“屋中屋”:**栏舍内 2 米高处拉铁丝绳,并拉上密集型的整条塑料薄膜纸。

**保温箱:**用长 2 米、宽 1 米、厚 0.1 米的整块木板三面装订成一个箱子,留下一个出入口,顶层用薄膜纸密封。

**保温灯:**功率 250W/个,视栏舍大小配置相应,主要放在保温箱里,高度是 1 米左右。

**热风炉:**热风炉起温速度、温度平稳性、操作简便程度、燃煤损耗以及养殖户接受程度均较传统煤炉拥有较大优势(10-20 分钟起温、每 300 头能耗 100-150 斤煤/天、猪舍温差 2-3 摄氏度)。

### ●保温设备的用法

**1、保温顺序:**先外后内(帐幕→屋中屋→箱温箱→保温灯→火炉)。

**2、平衡好保温与通风的关系。**通风换气顺序:先内后外(保温箱→屋中屋→帐幕)。尽量满足猪只的适宜温度,灵活处理好通风与保温的关系。防止低温高温,尽量保证好

的空气质量。早晚注意保暖,中午注意通风换气,防止昼夜温差过大。

### 3、具体操作方法:

**(1) 晚上(尤其是下半夜):**帐幕、“屋中屋”、保温箱基本上是要密闭的。

**(2) 早晨:**先把盖在保温箱上的薄膜纸打开一个口来给保温箱换气,再把“屋中屋”靠走道和排粪边部分的薄膜打开来换气,帐幕、保温灯和火炉暂时不变。

**(3) 临近中午:**如气温逐渐上升,先把栏内保温灯关闭;中午时,气温升到标准温度后,熄灭火炉;火炉熄灭及部分“屋中屋”打开后,如舍内比较闷热或气味较浓时,可以把不受风面或有阳光直晒那一面的帐幕适当降下(但帐幕高度还是比“屋中屋”高些),温度在上升时再依次放下受风面和“屋中屋”稍高的位置或把有阳光直晒那一面的帐幕适当降下到风吹不到猪身的高度,还是比较闷



【生猪养殖】

热时把受风面的帐幕再下降到风吹不到猪身的高度,较闷热时再把帐幕放到底。

**(4) 喂养猪:**每餐喂猪时都要打开保温箱盖和走道的“屋中屋”换气,也可以把保温灯暂时关一下,猪吃完料后如冷才关好,随着猪的日龄越来越大,视情况将排粪口端的屋中屋向中间慢慢打开,保持有一定的固定通风换气口。

**(5) 注意观察:**当帐幕、屋中屋,保温箱,保温灯都在控温状态下,猪群还表现打堆现象,舍内温度低的情况下,就要及时使用火炉来提高舍内温度。

**(6) 当舍内的异味较浓时**就要适当地打开“屋中屋”换气减异味浓度再适当下降背风边的帐幕通风。

曾玉露

## 【链接】

### 生猪要健康不可少粗粮

在集约化养猪的条件下,猪吃的是以玉米、豆粕、鱼粉等原料为主的配(混)合饲料。日趋“精”化的饲料日粮,其粗纤维含量十分低下,导致猪出现消化功能障碍、便秘等“富贵病”,影响了养猪效益的提高。实际上,让猪吃点“粗”粮,在日粮中保持适宜的粗纤维含量,对于降低饲养成本、提高生猪生产性能作用特别明显。

当然,日粮粗纤维含量过高也会对猪的

生长发育产生不良影响,只有适量的供应才能产生最优化的效果。同时,猪不同的生理时期对纤维素的消化能力不一样,应根据猪不同的生理阶段及其生理特点,在日粮中添加合适的比例。猪不同生理阶段日粮中粗纤维含量推荐如下:公猪,6%~8%;空怀及怀孕母猪,8%~12%;哺乳母猪,7%;后备猪,6.5%~8%;断奶仔猪,3%~4%;育肥猪,6%~7%。  
中畜

## 【实用技术】

### 养兔要重视喂夜料

饲料要合理搭配,不要喂单一品种。兔日粮中的营养成分为:粗蛋白、粗纤维各 10%,脂肪 5%,每公斤日粮含消化能 2800 大卡,氨基酸 10%。如无条件的喂配合饲料,应适当添加黄豆、豆饼、麸皮、玉米等精饲料和胡萝卜等多汁饲料。

**要重视喂夜料。**兔有较强的夜食性,夜间采食量可占全天采食量的 75% 以上。因此,夜间要给兔供足饲料和饮水。

**要缓慢换料。**常喂一种饲料,兔已具有了较强的适应能力,若突

然更换饲料,易引起兔肠胃病。因此,更换饲料要循序渐进。

**不要间断草料。**兔的盲肠里有许多能分泌纤维酶的微生物,具有较强的分解粗纤维的能力。但饲料进入兔胃后停留时间较短,所以饲喂草料不要间断,以防食团板结,阻塞盲肠和盲肠的蠕变。每只成年兔每天喂草料 0.5~1 公斤。

**不要喂得过早。**喂兔要定时定量,成年兔每天喂 4 次,幼兔每天喂 4~6 次,每次喂七八成饱,不可添料太勤或喂得太饱,以防引起兔腹泻、腹胀。  
阿里

**选用杂交品种。**用两个不同品种的公母兔杂交所得的杂交一代进行催肥可明显提高增重。选择杂交组合时,要求父本品种增重快,屠宰率和饲料报酬率高,母本品种产仔多,哺乳力强。

**确定催肥期。**幼兔一般从断奶后开始催肥,3-3.5 月龄,体重达 2.5 公斤时宰杀。在催肥期间,若发现兔采食量忽然减少,即标志兔催肥成熟,应立即出售。

**公兔去势。**去势有利于公兔积蓄脂肪,降低饲料消耗,使育肥速度提高 15%。去势时间应选在公兔

### 肉兔催肥技术要点

出生后的 56-70 天。常用去势方法是手术切除法,先将公兔腹部朝上放在凳子上,用绳将四肢固定,左手将其睾丸从腹部挤入阴囊,捏紧,使睾丸不能滑动,以酒精消毒阴囊,用手术刀将阴囊切开 1 个口子,挤出睾丸,切断精索,取出睾丸,用线缝合切口再用碘酒涂切口以消毒。

**精心管理。**催肥兔的饲料以精料为主。饲喂应定时定量,加喂夜食,每天喂 3-4 次,全天饲喂量的比例:早晨占 30%、中午 20%、晚上 50%。  
安农